

Prévention et prise en charge des infections sexuellement transmissibles chez les HSH/MSM

Par Dr KALUME ALEX, MD, MPH, MBA

Key Pop Program




ICAP

Global. Health. Action.

COLUMBIA UNIVERSITY
Mailman School of Public Health

PLAN DE PRESENTATION

- Introduction
- Les principaux syndromes en rapport avec les IST chez les MSM.
- Points clés de la Prise en charge des IST chez les HSH/MSM
- Conclusion



Introduction

Les infections sexuellement transmissibles constituent un problème majeur de santé publique.

Dans de nombreux pays, l'incidence des IST aiguës chez les MSM est élevée.

La méconnaissance du diagnostic et le fait de ne pas traiter les IST à leur début peut être à l'origine de complications et séquelles graves, notamment la stérilité, cancer ano-génital et décès prématuré.

Les dépenses , tant individuelles que nationales, liées à la prise en charge des IST peuvent être considérables.



ICAP

Global. Health. Action.

COLUMBIA UNIVERSITY


Mailman School of Public Health

Introduction (suite)

Chez les MSM et les personnes transgenres, les symptômes et les signes les plus courants d'IST, en dehors des manifestations génito-urinaires, comprennent aussi les infections rectales.

Lors de l'évaluation clinique, il faudra également s'attacher particulièrement à la recherche de signes et de symptômes d'infections ano-rectales principalement à chlamydia et à gonocoque, car celles-ci étant très répandues dans ces populations, comme le montre la réalisation de tests d'amplification des acides nucléiques.

Une mise à jour des lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge syndromique des IST est en cours la version révisée inclura un algorithme de prise en charge des infections ano-rectales.



Les principaux syndromes en rapport avec les IST chez MSM.

1. Syndrome en rapport avec la région génitale:

a. Ecoulement urétral:

Nom de l'infection	Microorganisme
Gonococcie	Naeseria gonorrhoea
Chlamidiose	Chlamydia trachomatis



ICAP

Global. Health. Action.
COLUMBIA UNIVERSITY
Mailman School of Public Health

Les principaux syndromes en rapport avec les IST chez les MSM (suite)

b. Ulcérations génitales:

Nom de l'infection	Microorganisme
Herpès virus simplex type 2	Herpes génital
Syphilis	Treponema pallidum
Chancre mou	Haemophilus ducreyi

Les syndromes en rapport avec les IST chez les MSM (suite)

2. Syndromes en rapport avec la région ano-rectale:

a. Ulcérations de l'anus:

Nom de l'infection	Microorganisme
Herpès anal	Herpès virus simplex type 2
Ulcération Gonococcique	Naesseria gonorrhoea
Chlamydieuse anale	Chlamydia trachomatis

Les principaux syndromes en rapport avec les IST chez les MSM(suite)

b. Ecoulement anal:

Nom de l'infection	Microorganisme
Gonorrhée	Naesserie gonorrhoea
Chlamyiose anale	Chlamydia trachomatis

Les Syndromes en rapport avec la région ano-rectale

À ce jour, aucune évaluation de sa spécificité et de sa sensibilité n'a été faite. Parmi les experts, il y a cependant eu consensus pour reconnaître que, en l'absence de données publiées, cet organigramme représente la meilleure approche clinique de ce syndrome

Chez toute personne ayant eu des rapports anaux passifs au cours des six derniers mois et/ou qui signale des symptômes anaux, il est recommandé selon cet algorithme de réaliser, en plus de l'interrogatoire et de l'examen clinique général, .



ICAP

Global. Health. Action.

COLUMBIA UNIVERSITY

Mailman School of Public Health


Les Syndromes en rapport avec la région ano-rectale(suite)

Un examen ano-rectal à la recherche de deux syndromes suivants:

Ulcérations anales, un traitement contre l'infection par le virus de l'herpes de type 2, plus un traitement à l'infection à chlamydia et la gonorrhée doit être proposé au patient . En cas d'écoulement anal accompagné de douleur , seul un traitement contre l'infection à chlamydia ou à une gonorrhée doit être proposé.

En l'absence de douleur un autre traitement approprié doit être proposé

(voir algorithme de PEC des infection ano-rectales)




Points clés de la Prise en charge des IST chez les HSH/MSM

Les succès de la prise en charge des IST exige des agents de santé qu'ils soient respectueux des patients et qu'ils ne prouvent pas de jugement (éviter la phobie).


L'examen clinique doit être réaliser dans un environnement approprié permettant de garantir l'intimité et la confidentialité nécessaires.

Dans certaines situations, vous agents de santé devez parvenir à dominer votre propre sensibilité et pouvoir traiter de manière ouverte et constructive des questions qui ont rapport avec la sexualité ou les IST chez les MSM.




Points clés de la Prise en charge des IST chez les HSH/MSM(suite)

Dans l'étude portant sur les valeurs et les préférences exprimées par la communauté, les personnes interrogées ont exprimé leur désir de bénéficier d'un ensemble complet de services, y compris de procédures de dépistage des IST. La prise en charge syndromique a été particulièrement conçue pour les situations où les ressources sont limitées ; sa faisabilité et son acceptabilité ont été prouvées dans la plupart des pays.



Conclusion

La prise en charge syndromique des IST repose sur l'identification de groupes cohérents des symptômes et des signes faciles à reconnaître (syndromes), et la fourniture du traitement, si possible en dose unique, approprié à la majorité des microorganismes responsables du syndrome en rapport avec une IST ou aux plus dangereux.



Conclusion (suite)

Les MSM et personnes transgenres peuvent aussi présenter des infections ano-rectales; chez eux ,la prise en charge syndromique ne doit pas se limiter à la recherche des symptômes et signes les plus communs, tels que l'écoulement urétral et les ulcérations génitales.

L'évaluation clinique doit aussi s'attacher à la recherche de syndromes de la région ano-rectale ,d'ulcérations de l'anus et d'un écoulement anal.

Les principaux syndromes en rapports avec les IST est pertinents chez les MSM et les personnes transgenres tel que décrit ci-dessus.

MERCI

